

# 猫咪common：理解和应对猫咪行为常见问题，让爱宠生活更和谐

很多铲屎官在养猫过程中，都会遇到一些让自家猫咪“common”（常见）的行为问题，比如突然乱叫、随地大小便、过度舔毛、攻击性行为等。这些看似小小的“common”状况，却可能让主人的生活变得一团糟，甚至影响到与猫咪的情感连接。理解这些行为背后的原因，并掌握有效的应对方法，是每位负责的猫主人都应该了解的。猫咪common的行为并非一定是猫咪“坏”了，更多时候是它们在用自已的方式表达需求、释放压力，或是对环境变化的一种反应。因此，我们首先要做的，是放下“教育”或“惩罚”的心态，尝试去“读懂”你的猫咪。

## 识别猫咪“common”行为背后的语言

猫咪的“common”行为，往往是它们与外界沟通的方式。例如，当一只猫咪在你睡着时突然开始嚎叫，这可能是在表达它饿了、无聊了，或者只是想引起你的注意。夜间活跃是猫咪的本能，但过于频繁或响亮的叫声，也可能暗示着健康问题，比如甲状腺功能亢进，或者老年猫咪的认知功能障碍。随地大小便也是一个令人头疼的“common”问题，这通常与猫砂盆有关。猫咪可能不喜欢猫砂的材质、气味，或者猫砂盆不够干净。此外，如果猫咪的健康状况发生变化，比如泌尿系统感染，也会导致排尿疼痛，从而将排尿行为与猫砂盆关联起来，选择其他地方如地毯或床上排泄。过度舔毛，尤其是局部过度舔毛，常常是猫咪焦虑、压力过大或皮肤过敏的信号。它们可能是在通过舔舐来自我安抚，但长此以往，会导致毛发脱落，甚至皮肤损伤。至于攻击性行为，这可能源于恐惧、疼痛、领地意识，或者是在玩耍中过度兴奋。了解这些行为背后的“猫语”，是解决问题的第一步。

## 常见“common”行为的处理与预防

针对猫咪的“common”行为，采取有针对性的措施是关键。对于夜间叫声，首先排除健康问题，然后可以尝试在睡前给猫咪提供一些富含蛋白质的零食，或者玩耍一小时，让它们消耗精力。其次，确保猫咪的猫砂盆清洁且舒适。每天至少清理一次，并定期更换猫砂。不同猫咪对猫砂的偏好不同，可以尝试多种材质和品牌的猫砂，找到最适合的。如果猫咪仍然随地大小便，需要仔细检查猫砂盆的位置是否远离嘈杂区域，以及是否有其他猫咪的“竞争”。对于过度舔毛，需要先排除皮肤病和过敏。如果确诊为心理因素，可以尝试为猫咪提供更多的互动和玩具，减轻它们的压力。使用信息素喷雾或扩散器，也能帮助缓解猫咪的焦虑情绪。玩耍是释放猫咪天性的的重要途径，尤其对于室内猫，每天安排几次高质量的玩耍时间，可以有效减少因无聊或压力引起的不良行为。

## 剖析猫咪“common”行为的差异与误区

理解猫咪的“common”行为，还需要区分个体差异和避免常见的误区。每只猫咪都有自己的个性和经历，即使是同一品种，行为表现也可能大相径庭。一只内向胆小的猫咪，可能对环境变化反应更强烈；而一只性格外向的猫咪，则可能更容易出现玩耍中的过度兴奋。因此，不能用一套标准来衡量所有猫咪。一个常见的误区是认为猫咪的“common”行为是它们故意的报复行为。例如，认为猫咪乱尿是在“报复”主人惹它生气。实际上，猫咪并不具备人类复杂的道德观和报复心理，它们的行为更多是基于本能和环境刺激。另一个误区是过度依赖惩罚。打骂或恐吓猫咪，不仅无法解决根本问题，反而会加剧它们的恐惧和焦虑，导致问题恶化，甚至破坏与主人的信任关系。正确的做法是通过正向强化，奖励它们正确的行为，同时排除不良行为的诱因。

## 宠物健康与行为的关联：不容忽视的“common”信号

有时候，猫咪的“common”行为背后，可能隐藏着更深层的健康问题。例如，突然性的食欲改变、精

---

神萎靡，或者排便习惯的异常，都可能是疾病的早期信号。老年猫咪出现的“common”行为，如夜间不安、迷失方向，很可能是认知功能衰退的表现，类似于人类的老年痴呆。因此，当猫咪出现持续性的、难以解释的“common”行为改变时，最明智的选择是带它们去看兽医。专业的兽医能够通过检查，排除或确诊潜在的健康隐患，并提供相应的治疗方案。即使是行为问题，在某些情况下，也需要兽医的介入，比如通过药物辅助治疗严重的焦虑症。不要等到问题严重到无法收拾才求助，及早发现和干预，对猫咪的身心健康都至关重要。

## FAQ

\* 猫咪乱抓家具是“common”行为吗？是的，这非常常见。这是猫咪磨爪、标记领地的本能。可以通过提供足够的猫抓板、猫抓柱，并引导它们使用来解决。

\* 我家猫咪总是对着空气叫，是怎么回事？这可能是听到了人类听不到的声音（如老鼠、昆虫），或者是一种玩耍、探索的表现。如果频率不高且不影响生活，通常无需担心。

\* 猫咪突然变得很粘人，也是“common”行为吗？  
这可能是在寻求安慰，或者对环境变化感到不安。可以多花时间陪伴和安抚它。

\* 是否应该给猫咪“纠正”所有“common”行为？不一定。首先要理解行为背后的原因，如果是不影响健康和生活的正常本能行为，可以尝试理解和接纳。如果确实影响到正常生活或猫咪自身健康，则需要找到合适的方法。